Bestimmungs-Schlüssel

für die 7 wichtigsten Blütenpflanzenfamilien, © Thomas Seilnacht

andere Blütenform

5 Blumenkronblätter oder mehr, mehr als 20 Staubblätter



Honigblätter vorhanden, Kelchblätter am Grund nicht verwachsen

Hahnenfußgewächse

(Scharfer Hahnenfuß, Sumpfdotterblume, Buschwindröschen)

keine Honigblätter, Kelchblätter am Grund verwachsen, Früchte: Obst oder Beeren

Rosengewächse

(Heckenrose, Erdbeere, Apfel, Birne, Kirsche, Brombeere)

4 Blumenkronblätter und 4 Kelchblätter, 4 lange und 2 kurze Staubblätter



Kreuzblütler

(Knoblauchsrauke, Wiesen-Schaumkraut, Hirtentäschel)

Blütenstand in Dolden



Doldenblütler

(Wiesenkerbel, Bärenklau)

verwachsene Blumenkronblätter mit Ober- und Unterlippe, oft vierkantiger Stängel und Blätter gegenständig, 2 kurze und 2 lange Staubblätter



Lippenblütler

(Wiesensalbei, Taubnessel)

Schmetterlingsblüten mit Fahne, 2 Flügeln und Schiffchen, 10 Staubblätter



Schmetterlingsblütler

(Wiesenklee, Wicke, Robinie)

Blütenstand mit Röhrenblüten und / oder mit Zungenblüten



Korbblütler

(Gänseblümchen, Löwenzahn)

www.digitalefolien.de

Nur auf Datenträger mit gültiger Lizenz nutzbar!